

POLÍTICA MÉDICA PARA LA UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTO BOTOX

1. Definición - Toxina botulínica tipo A; neurotoxina que causa la interrupción de la transmisión nerviosa mediante la inhibición de la liberación del neurotransmisor acetilcolina.
2. Indicaciones - ACAA cubrirá el uso de este medicamento en aquellos casos en que el accidente haya causado daños al sistema nervioso central con espasticidad o daño que impida o limite significativamente el proceso y los tratamientos y/o procedimientos de rehabilitación. El médico debe documentar los problemas funcionales que resulten debidos a la espasticidad focal y las metas funcionales que se pretende alcanzar con el uso de medicamento.
3. El Director de Asuntos Médicos o la persona en que éste delegue podrá autorizar hasta 600 unidades por sesión cada 90 días hasta un máximo de cuatro (4) sesiones.
4. En caso de necesitar tratamiento adicional se deberá documentar si hubo mejoría clínica significativa; en los casos de espasticidad se deberá detallar arco de movimiento de la articulación afectada. El cambio en espasticidad deberá ser documentada siguiendo la escala modificada de Ashworth.

Escala Modificada de Ashworth*

0= No aumento en tono muscular.

1= Leve incremento en tono muscular, manifestado por una captura y liberación o por resistencia mínima al final de arco de movimiento cuando la articulación se mueve flexión y extensión /abducción o adducción, etc.

1+= Leve aumento en tono muscular, manifestado por una captura, sostenida por resistencia mínima a través del resto (menos de la mitad) del arco de movimiento.

2= Más marcado aumento en tono muscular a través de la mayoría del arco de movimiento, pero el área afectada se puede mover con facilidad.

3= Aumento considerable en tono muscular, movimiento pasivo es difícil.

4= Área afectada está rígida en flexión o extensión (abducción o adducción, etc.)